

SOMMAIRE

- **Ambroisie à feuilles d'Armoise:**
La pollinisation a commencé
- **Raisin d'Amérique:**
Les fruits sont mûrs
- **Datura Stramoine :**
Période de fructification



**L'ENSEMBLE DE LA
PLANTE EST TOXIQUE,
NE PAS INGÉRER!**

!! RAPPEL !!

Le pollen de cette Astéracée représente un grand problème de santé publique ! Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les premiers symptômes apparaissent: pathologies respiratoires (rhinites, trachéites), conjonctivites et parfois urticaires. Ces derniers étant d'autant plus importants que le taux de pollen dans l'air est élevé.

AMBROISIE À FEUILLES D'ARMOISE

LA POLLINISATION A COMMENCÉ

Ambrosia artemisiifolia a commencé sa pollinisation en Bretagne depuis le 15 août. L'émission de pollen se poursuit jusqu'en octobre, passant par un maximum en septembre (pic pollinique). A noter que le vent est capable de transporter les grains de pollen sur une centaine de kilomètres. Des pollens d'ambroisie peuvent ainsi être identifiés dans des endroits où la plante n'est pas présente !



Photo : Plant d'Ambroisie à feuilles d'Armoise en zone agricole. Quistinic (56) - FREDON Bretagne juillet 2022.

Entre 1,7% et 5,4% de la population française, serait allergique à l'ambroisie soit entre 1 et 3,5 millions de personnes!

Sa taille permet maintenant de mieux la distinguer à travers la végétation. Le pollen étant très allergisant, en cas d'observation, merci de nous contacter afin d'organiser une gestion du foyer.



Photo : Une centaine de pieds d'Ambroisie à feuilles d'Armoise arrachés dans une parcelle agricole. Quistinic (56) - FREDON Bretagne - juillet 2022.



RAISIN D'AMÉRIQUE

LES FRUITS SONT MÛRS



Les fruits du raisin d'Amérique (*Phytolacca americana*) sont pour la plupart arrivés à maturité. Leur couleur passe donc du vert au violacé ce qui leur confère leur appétence.

Pour éviter sa dissémination, il est important de récolter les grappes et de les porter à la déchetterie pour incinération.

!! RAPPEL !!

L'ingestion de quelques baies suffit à provoquer des symptômes d'intoxication (diarrhée aigue, vomissements, douleurs abdominales, tachycardie, vertiges). Sa toxicité est également avérée pour les bovins, les porcs, les chevaux, les moutons et certaines volailles.

Photo : Grappe de fruit de raisin d'Amérique mûr.
Rennes (35) - FREDON Bretagne - Août 2022.



DATURA STRAMOINE

PÉRIODE DE FRUCTIFICATION



Le datura stramoine (*Datura stramonium*) est en période de fructification. Ses grandes fleurs blanches et ses fruits sphériques, recouverts de nombreuses épines permettent de facilement l'identifier.

Cette adventice peut se retrouver dans les champs de légumes ou de sarrasin et occasionner d'importantes pertes de rendements ou encore être récolté en même temps que la culture et entrer dans la chaîne de fabrication des aliments.



Photo : Plant de datura stramoine en fruit.
Sarzeau (56). FREDON Bretagne août 2022.



Photo : Plant de datura stramoine en fleur.
Sarzeau (56). FREDON Bretagne août 2022.

!! RAPPEL !!

Le risque sanitaire provient de sa consommation volontaire ou accidentelle, quelques grammes suffisent à entrainer des troubles divers pouvant aller jusqu'à la mort. Les doses létales sont cinq fois plus faibles chez l'enfant que chez l'adulte. Les plants arrachés doivent être incinérés en déchetterie.